

## Quelles méthodes sont inefficaces?

### LE DÉLOGEMENT

L'utilisation de signaux sonores ou d'oiseaux prédateurs pour déloger les mouettes n'est pas évidente dans un environnement urbain, à cause des nuisances sonores ou de la visibilité restreinte du fauconnier. En outre, on ne fait que déplacer le problème. Les signaux sonores peuvent faciliter la relocalisation des mouettes, mais elles s'y habituent rapidement. Lorsque les mouettes ne causent pas de nuisance, laissez-les tranquilles.

### LES OISEAUX PRÉDATEURS EN PLASTIQUE OU LES CERFS-VOLANTS

L'effet de peur est généralement de courte durée. Les mouettes fûtées s'accoutument rapidement aux oiseaux 'factices'.

### LA CONTRACEPTION

Une intervention sur la fécondation des oeufs fonctionne uniquement dans des conditions extrêmement contrôlées. Il est à la fois difficile et onéreux de déterminer la dose correcte de contraception et de veiller à ce que chaque oiseau l'absorbe.

### LA CAPTURE OU L'ABATTAGE

De telles techniques de lutte contre les mouettes n'ont aucun sens: chaque mouette éliminée est rapidement remplacée par une autre de Belgique ou ailleurs.

### L'EMPOISONNEMENT

Il est quasiment impossible de donner du poison aux mouettes sans que cela ne représente un danger pour d'autres animaux ou pour les humains. De plus, l'empoisonnement de ces oiseaux protégés est interdit.

## Que faire lorsqu'on trouve une mouette blessée?

Si vous trouvez une mouette ou un autre oiseau blessé: prenez alors contact avec le Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (centre d'accueil pour oiseaux et animaux sauvages) au numéro 059 80 67 66. Ce centre est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Adresse: Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende

## Si vous avez d'autres questions:

A propos des mouettes [www.mouettesenville.be](http://www.mouettesenville.be)

Ce site Internet donne entre autres l'affiche et deux films documentaires sur des mouettes.

### A propos de la gestion de la côte

La Province de Flandre occidentale.  
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende  
T 059 34 21 47

E [kust@west-vlaanderen.be](mailto:kust@west-vlaanderen.be) - [www.kustbeheer.be](http://www.kustbeheer.be)

## Colophon

Ce dépliant est publié par la Province de Flandre occidentale.

**Y ont collaboré:** Irene van der Craats, Kathy Belpaeme, Jacky Dereu, Roland François, Paul Lingier, Hannelore Maelfait, Jan Seys, Eric Stienen (INBO) en Claude Velter  
**Photo's:** Roland François en Roy Verge  
**Mise en page et impression:** Service graphisme de la province de Flandre occidentale  
**Rédaction:** Marc Dejonckheere  
**Éditeur responsable:** Rik Samyn, directeur dienst gebiedswerking  
**Numéro de dépôt:** D/2014/0248/10

Les partenaires de la Province de Flandre occidentale:



Cette brochure est réalisée dans le cadre du projet Interreg IVA '120 Kilometer Kustkwaliteit.'

# Mouettes @côte



Salut la mouette!  
Tu es aussi importune  
qu'excellente acrobate.

Quelques conseils pour cohabiter en harmonie.



1



2



3



4



5

Cette **mouette 'brune'** n'appartient à aucune espèce particulière, mais il s'agit d'une jeune mouette. Les petits du goéland marin et du goéland argenté prennent tranquillement le temps de revêtir leur plumage d'adulte. Cela peut durer presque 4 ans.

**Pour observer les Laridés de la rangée la plus haute, il faut déjà avoir de la chance:**

- 1. **La mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*), oiseau rare le long de notre littoral. Ce véritable oiseau estivant recherche sa nourriture dans les pâturages.
- 2. **Le goéland leucophée:** (*Larus michahellis*), dont les pattes jaunes le distinguent du goéland argenté.
- 3. **La mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*), véritable oiseau de mer qu'on ne voit presque jamais sur le littoral. On la reconnaît aux pointes noires de ses ailes, comme si on les avait trempées dans un pot d'encre.
- 4. **Le goéland cendré** (*Larus canus*) oiseau nicheur rare chez nous.
- 5. **La mouette pygmée** (*Larus minutus*), la plus petite des mouettes. Elle niche dans les marais situés au nord-est de l'Europe et fait une escale dans notre pays lors de la migration.



**La sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) et son petit. Bien que cet oiseau ressemble également quelque peu à une mouette, il s'agit d'une sterne. Les sternes pierregarins sont des oiseaux minces à bec rouge qui sont beaucoup plus gracieux que les mouettes.



**La mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) est une mouette typique du littoral. Elle vit toute l'année dans notre pays. Elle niche en grandes colonies le long de notre littoral, mais aussi dans l'arrière-pays. Elle est friande de vers de terre.



**Le goéland brun** (*Larus fuscus*) adore le poisson. Il passe beaucoup de temps en pleine mer, et suit souvent les bateaux de pêche. L'hiver, il recherche les régions plus chaudes et on le trouve le long des côtes espagnoles et portugaises.



**Le goéland marin** (*Larus marinus*) passe l'hiver chez nous. Il vit principalement le long du littoral et en mer.



**Le goéland argenté** (*Larus argentatus*) raffole des coquillages et des déchets de poissons. Cette espèce est présente toute l'année, et en particulier près de la côte.



## Les hommes et les mouettes: sont-ils des voisins parfaits?

Les mouettes sont un parfait exemple d'oiseaux qui vivent en colonie. Elles nichent traditionnellement dans les zones de dunes et les 'schorren' (prés salés). Elles se nourrissent de moules, coques, petits crabes, poissons, etc. En raison de l'activité humaine croissante sur la côte durant le siècle dernier, leurs aires de nidification naturelles ont disparu et sont devenues de plus en plus menacées. La côte et la mer forment un habitat idéal : déchets et donc nourriture en abondance et sur les toits plats des grands immeubles plein d'endroits pour faire des nids. Elles trouvent en l'homme un voisin bien pratique ce qui crée régulièrement irritation chez résidents et touristes. Par contre, les passants peuvent admirer de près les tourbillonnant acrobaties aériennes des mouettes.



Ce dépliant donne quelques conseils pratiques pour pallier leurs côtés parfois agaçants et rendre ainsi plus agréable la cohabitation avec les mouettes. L'affiche accentue l'interdiction de nourrir les mouettes.

## Le nombre de mouettes ne s'accroît pas. Mais qu'en est-il des nuisances?

On a l'impression que le nombre de mouettes ne fait qu'augmenter. Les chiffres démontrent toutefois le contraire. Au-delà des frontières, les mouettes rieuses et les goélands argentés ont connu leur apogée il y a entre dix et vingt ans environ. Depuis cinq ans, la population des mouettes diminue également en Belgique.

On ne s'attend pas à une hausse de la population totale des mouettes. Toutefois, ces acrobates des airs peuvent de temps à autres causer quelque nuisance, non pas parce que leur nombre augmente, mais parce qu'elles ont dû, par la force des choses, aller nicher plus près des humains. En effet, le nombre des aires de nidification semi-naturelles restantes diminue à vue d'oeil. C'est pour cette raison que les mouettes recherchent un lieu de nidification de substitution. Elles nichent désormais sur les toits des bâtiments de la zone urbaine. Elles y trouvent d'ailleurs leur nourriture.

Certains côtés agaçants rendent de temps en temps les mouettes moins sympathiques, mais nous comportons-nous toujours de manière exemplaire?

## Quelles sont les mouettes que l'on peut voir sur notre littoral?

Les espèces de mouettes les plus courantes sur notre littoral sont le goéland argenté (*Larus argentatus*), la mouette rieuse (*Larus ridibundus*), le goéland brun (*Larus fuscus*), le goéland cendré (*Larus canus*) et le goéland marin (*Larus marinus*). Avec un peu de chance, on peut apercevoir également la mouette pygmée (*Larus minutus*) ou la sterne pierregarin (*Sterna hirundo*), ainsi que la mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*), le goéland leucophée (*Larus michahellis*) et la mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*).

Regardez à l'intérieur pour les photos de ces mouettes.

## Des mouettes qui nichent sur les toits

Depuis plus de 20 ans, le goéland argenté couve dans des nids habilement installés sur les toits de la région côtière. Depuis 1999, le goéland brun y a également trouvé sa place. Dans leur recherche de nouveaux lieux d'incubation, les oiseaux ont trouvés dans les bâtiments du centre de plusieurs villes côtières ainsi que dans les alentours (tels que toits d'hangars et criées aux poissons) des endroits attrayants. Depuis 2005, les toits de l'avant-port de Zeebrugge sont devenus également des lieux de couvain. Les chercheurs constatent une augmentation lente mais constante du nombre de nicheurs sur les toits. Les toits de la ville constituent naturellement d'excellents lieux de nidification: les mouettes peuvent y nicher tranquillement et sont hors de portée des prédateurs terrestres tels que les rats ou les renards. Cependant, est-ce une évolution souhaitable? La nuisance que créent les mouettes est considérable. Une gestion bien fondée sur les lieux d'incubations des mouettes est de ce fait nécessaire.

En haut: Goéland brun avec sa progéniture

En dessous à gauche: Goéland argenté avec petits

En dessous à droite: Ce sont surtout les Goélands argentés et bruns qui raffolent des déchets de la pêche.





Goéland argenté acrobatique



Goéland bourgmestre balance entre les pics



Une jeune mouette riieuse



La mouette tridactyle

## Les mouettes vous agacent? Vous pouvez y faire quelque chose!

Les mouettes qui survolent la plage ou le port créent une ambiance de détente sur le littoral. Elles font partie du paysage. Pendant certaines périodes, la présence des mouettes peut être néanmoins considérée comme gênante. Mais les habitants et les touristes peuvent observer quelques règles pratiques pour éviter ces petits désagréments et permettre ainsi de cohabiter de façon bien plus agréable.

### POLLUTION

Les mouettes en quête de nourriture percent les sacs poubelles ou vident les poubelles. La saleté de la rue exaspère les piétons et nuit au tourisme. Les excréments des mouettes sont également dégoûtants: ils salissent les toits, les voitures, les trottoirs et même ... les gens.

### Que peut-on faire?

Sortez vos sacs poubelles juste avant le ramassage des ordures. Pas de déchets qui traînent = pas de nuisance. Refermez vos sacs poubelles autant que possible. Etes-vous allés à la plage ? Emportez vos déchets ou laissez les dans un des nombreux bacs disponibles sur et aux alentours de la plage.

### AGRESSIVITÉ

Les mouettes sont de grands oiseaux au regard effronté. Pour attraper un petit morceau, elles sont parfois d'une hardiesse incroyable. Leur vol peut alors ressembler à une attaque. Pendant la saison des nids, d'avril à août, le réflexe de défense des oiseaux parents qui consiste à se précipiter sur tout ce qui s'approche de leur ponte ou de leurs petits peut être parfois dangereux.

### Que peut-on faire?

Ne nourrissez pas les mouettes. Elles n'ont certainement pas faim et les restes de nourriture attirent aussi les prédateurs (rats). Qui plus est: nourrir les mouettes est même interdit par la loi et le règlement de police. Dans certaines communes de la côte, cela peut faire l'objet d'amendes élevées. Et restez, dans la mesure du possible, à l'écart des nids de mouettes.

### CRIS STRIDENTS

Tout comme le vent et les vagues, les cris stridents des mouettes font partie de l'atmosphère du littoral. Pendant la saison des nids, et en particulier au moment où les petits quittent le nid, les cris stridents peuvent s'avérer être gênants. Aux premières heures du jour, les oiseaux parents adoptent une attitude très bruyante et agressive pour protéger leur progéniture.

### Que peut-on faire?

Empêchez la nidification sur les toits si les cris stridents vous gênent. Vous trouverez quelques conseils à ce sujet en lisant la suite de ce dépliant. Signalez les tentatives de nidification sur [www.meeuwenindestad.be](http://www.meeuwenindestad.be). La Province de Flandre occidentale souhaite connaître le lieu et la nature éventuelle des nuisances causées par les mouettes. Ne détruisez jamais les oeufs vous-mêmes. Non seulement parce que les mouettes sont des oiseaux protégés, mais aussi parce que cela n'est tout simplement d'aucune utilité. Les oiseaux pondront tout simplement de nouveaux oeufs. C'est dans leur nature.

### Que peut faire la commune pour prévenir des nuisances?

- Prévoir des poubelles rigides et fermées dans les lieux publics. En effet, les sacs poubelle plus résistants ne sont pas efficaces.
- Le temps entre la sortie des sacs poubelles et leur enlèvement doit être limité au maximum.
- Proposer des solutions de ramassage des ordures adaptées aux touristes et aux résidents secondaires, comme des conteneurs souterrains ou un ramassage nocturne.
- Vider en temps voulu les poubelles de la plage, qui sont souvent surchargées.
- Donner des informations précises (par ex. via des panneaux) sur le comportement à adopter et l'interdiction de nourrir les oiseaux.
- Prendre des mesures plus sévères contre les personnes qui nourrissent les mouettes.
- Contrôler et lutter contre le délabrement et l'inoccupation, afin d'éviter toute nidification indésirable.

- Prendre activement des mesures pour empêcher les tentatives de nidification dans les lieux indésirables.
- Encourager les habitants et les résidents secondaires à prendre des mesures préventives pour éviter la nidification.

### Comment empêcher la nidification?

Plusieurs mesures préventives peuvent être adoptées afin de prévenir la nidification des mouettes sur les toits.

- Inspectez régulièrement votre toit ou votre jardin, en particulier d'avril à fin juin. Toute présence perturbante rend le lieu moins attrayant pour la nidification.
- Faites en sorte de maintenir la pente du toit lisse et dégagée, afin qu'aucun matériau de nidification ne puisse s'amonceler.
- Enlevez de votre toit tout matériau de nidification potentiel (petites branches, mousse, feuilles).
- Pour les toits plats faciles d'accès, l'utilisation de **filets** peut être efficace. Il est vrai qu'ils sont onéreux et pas toujours esthétiques. Choisissez pour cette raison une couleur neutre.
- Pour les endroits à risques (cheminées, avant-toit, lucarnes), vous pouvez placer des **pics** rapprochés, particulièrement sur les toits inclinés propices à la nidification. Veillez toutefois à ce que votre toit reste esthétique et qu'il ne ressemble pas à celui d'un château fort.
- Les **câbles** placés aux endroits à risques (toits plats ou légèrement inclinés) ne sont pas aussi efficaces contre la nidification, mais ils empêchent que les mouettes ne viennent s'y reposer ou y dormir. De ce fait, cela réduit la présence d'excréments sur le toit. Il est préférable de placer les câbles parallèlement au toit. Gardez aussi à l'esprit l'aspect esthétique: n'utilisez pas de câbles de couleur.

**Les filets, pics ou câbles doivent être placés de manière professionnelle et être régulièrement entretenus. Il faut également tenir compte du fait que les mouettes sont des oiseaux protégés: les mesures doivent être prises uniquement avant ou après la couvaison. Vous pouvez obtenir des adresses de fournisseurs sur [www.mouettesenville.be](http://www.mouettesenville.be) ou par téléphone au +32(0)59 34 21 47..**